



FUNDACIÓN

GIST Chile
cánceres gastrointestinales

Cáncer Colorrectal

Cáncer Colorrectal (CCR) es uno de los cánceres **más comunes en el mundo**! El CCR sigue siendo uno de los mayores responsables de muertes a nivel mundial, pese a los avances en el tamizaje para un diagnóstico temprano?

Factores de riesgo;³
69 años, edad promedio en la que un paciente es diagnosticado con cáncer colorrectal.



EDAD



GENÉTICA




ESTILO DE VIDA



CCR es la causa de muerte de una persona por minuto

A medida que el tumor se desarrolla, éste **puede propagarse a los ganglios linfáticos y hacer metástasis en otros órganos**⁵

La mayoría de los casos de este tipo de cáncer **empieza con un pólipo de pequeño crecimiento** en el tejido de la pared del colon o del recto. Algunos pólipos pueden convertirse en cancerosos, y empezar a crecer a través de las capas de tejido del colon o del recto⁴



Fuentes:

1. GLOBOCAN 2012 http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx
2. Edwards BK et al. Annual Report to the Nation on the Status of Cancer, 1975-2006, Featuring Colorectal Cancer Trends and Impact of Interventions (2009); 116 (3): 544-573
3. <http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/overviewguide/colorectal-cancer-overview-what-causes>
4. National Cancer Institute. <http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/detection/colorectal-screening>
5. National Cancer Institute. <http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/colon/Patient/page2>
6. John SKP et al. Symptoms and signs in patients with colorectal cancer. Colorectal Disease (2011); 13: 17-25
7. Labianca R et al. Primary colon cancer: ESMO, adjuvant treatment and follow-up. Ann Oncol (2010); 21 (suppl 5):v70-v77
8. Van Cutsem E et al. Advanced colorectal cancer: ESMO. Annals of Oncology (2010); 21 (Supplement 5): v93-v97
9. <http://www.cancer.gov/cancertopics/treatment/types/targeted-therapies/targeted-therapies-fact-sheet>

Síntomas⁶

Los síntomas del Cáncer Colorrectal son a menudo ambiguos y pueden confundirse con otras enfermedades como síndrome de colon irritable, enfermedad de Crohn o úlcera péptica.

Sangrado
rectal

Dolor en el
abdomen

Cambios en
los hábitos
intestinales

Pérdida de
peso

Prevención

50 años

Generar conciencia sobre los síntomas y los programas de tamizaje disponibles, son vitales para mejorar el pronóstico de los pacientes. Los lineamientos europeos recomiendan un test cada 1 o 2 años empezando a los 50 años de edad.⁷

- Prueba de sangre oculta en heces
- Colonoscopia

Tasa de supervivencia de 5 años para

90%
diagnóstico temprano
hasta 13%
diagnóstico tardío

Tratamiento^{7,8}

varía dependiendo de:

Tamaño del tumor Etapa del diagnóstico Localización del tumor Salud física del paciente

Riesgo de recaída que el cáncer reaparezca

En general, las opciones para tratamiento son:

Etapa temprana

Cirugía
Quimioterapia

Etapa tardía

Cirugía
Quimioterapia
Terapias Biológicas

Un creciente número de terapias están disponibles para tratar la metástasis de este tipo de cáncer.⁹

¿CÓMO CONTACTARSE CON NOSOTROS?

contacto@gist.cl | www.gist.cl | +56 2 2207 5556